

<p>¿Qué son las oxiurias o lombrices intestinales?</p>	<p>Infección intestinal provocada por pequeños parásitos, no provoca ningún daño o lesión en el intestino.</p>
<p>¿Cómo prevenir el contagio?</p>	<p>Mantener una adecuada higiene de manos al menos después de acudir al WC y antes de las comidas.</p>
<p>¿Cómo identificarlas?</p>	<p>Los síntomas generalmente comienzan de 2 a 4 semanas después del contagio. Lo más frecuentes son el picor en la región anal, más intenso durante la noche, pudiendo producir problemas como sueño intranquilo, irritabilidad, despertares frecuentes, pesadillas etc... Suele acompañarse de picor en área de los genitales originando irritación e inflamación secundaria al rascado.</p>
<p>¿Qué hacer?</p>	<p>Si se detectan los síntomas, y/o se visualizan los parásitos en las heces, deben acudir al pediatra o médico habitual para que instaure el tratamiento necesario.</p>
<p>¿Puede ir el alumno al centro?</p>	<p>Los alumnos diagnosticados permanecerán mínimos 24horas tras el inicio del tratamiento en el domicilio.</p>
<p>Una vez se conoce el diagnostico</p>	<p>Lavado de manos frecuente, e insistir frotando debajo de las uñas: Sobre todo después de ir al baño y antes de comer. Mantener las uñas cortas y limpias. Limpiar con agua y jabón los glúteos y el ano cada vez que vaya al servicio. Lavar con agua caliente (más de 30º) la ropa de cama y de baño que estuvo en contacto con el niño sin sacudirla. Usar pijamas cerrados para evitar el rascado nocturno y con ello la diseminación del parásito.</p>